

核准日期：2007年03月13日
修改日期：2009年01月09日
修改日期：2013年07月05日

小牛血清去蛋白注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

【药品名称】

通用名称：小牛血清去蛋白注射液
商品名称：奥德金
英文名称：Deproteinised Calf Blood Serum Injection
汉语拼音：Xiaoniuxueqingqudanbai Zhushuye

【成份】本品为小牛血清去蛋白提取、精制而得，内含多种游离氨基酸和肽。

【性状】本品为淡黄色的澄明液体。

【适应症】

1. 改善脑部血液循环和营养障碍性疾病（缺血性损害、颅脑外伤）所引起的神经功能缺损。
2. 末梢动脉、静脉循环障碍及其引起的动脉血管病，腿部溃疡。
3. 皮肤移植术；皮肤烧伤、烫伤、糜烂；愈合伤口（创伤、褥疮）；放射所致的皮肤、粘膜损伤。

【规格】5ml:0.2g（总固体）。

【用法用量】本品可以用于静脉注射、动脉注射、肌肉注射，也可加入输液中滴注或加入 200 ~ 300ml 5%葡萄糖或0.9%氯化钠注射液中静脉滴注，滴注速度约2ml/min。

1. 静脉给药：

- (1) 脑部缺血性损害：一次20~30ml静脉滴注，一日一次，连续2~3周。
- (2) 动脉血管病：一次20~50ml静脉滴注，一日一次，或一次20~50ml动脉或静脉注射，每周数次，四周一个疗程。
- (3) 腿部或其它慢性溃疡、烧伤：每次10ml静注（或5ml肌注），一日一次或每周数次，按愈合情况可加用本品局部治疗。
- (4) 放射引起的皮肤、粘膜损伤的预防和治疗：在放疗期间，平均一日5ml静注。

2. 尿道给药：

放射性膀胱炎：一日10ml联合抗菌素治疗经尿道给药。

【不良反应】过敏反应极为罕见（例如荨麻疹，皮肤潮红，药物热，休克等）。如发生过敏反应立即停药，并给予抗过敏处理。

【禁忌】对本品或同类药品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品不宜与其它药物混合输注。
2. 本品为高渗溶液，肌肉注射时要缓慢，注射量不超过5ml。
3. 本品如果发生沉淀或混浊，禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】本品对母婴无不良影响，但使用时要注意对婴儿可能产生的潜在危险。

【儿童用药】缺乏在药理、毒理或药代动力学方面与成人差异对比的研究资料。

【老年用药】缺乏本品在老年人由于机体各种功能衰退的关系而对于该药品在药理、毒理或药代动力学方面与成人差异的临床研究资料。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】本品能促进细胞对葡萄糖和氧的摄取与利用。在低血氧以及能量需增加等情况下，本品可以促进能量代谢。增加供血量。

【药代动力学】尚不明确。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】低硼硅玻璃安瓿。5支/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】《国家食品药品监督管理局国家药品标准》WS₁-(X-398)-2004Z-2013

【批准文号】国药准字H20000202

【生产企业】

企业名称：锦州奥鸿药业有限责任公司
生产地址：锦州市太和区松山大街55号
邮政编码：121013
电话号码：(0416) 3863131

【药品上市许可持有人】

企业名称：锦州奥鸿药业有限责任公司
生产地址：锦州市太和区松山大街55号
传真号码：(0416) 3885230
网 址：www.avancpharma.com